GD GROUP

Toluene

소개

GD Toluene은 향기로운 냄새가 나며 물 보다 밀도가 낮고 불용성이므로 물에 녹지 않는 액체입니다.

일반 정보

유기합성화학에서 아주 중요한 화합물입니다.
많은 물질을 합성하는 원료로 사용되고, 용매로서도 광범위한 용도가 있어 황, 요오드, 브롬, 인 및 기타 무극성 물질과 같은 극무기화학물질을 용해시킬 수 있습니다.

포장

Catalog #	Volume
010-2012-1010	1Liter
010-2012-1050	5Liter

염색 방법

GDCHEM은 HARRIS HEMATOXYLIN 및 EOSIN에 대한 자동 고정 및 염색 수동 조직 검사 절차를 권장합니다.

* 처음에 GDCHEM Xylene으로 조직 절편의 파라핀 제거

step * Solution	Time
Xylene	25 seconds
Xylene	25 seconds
Xylene	25 seconds
99.9% Alcohol	25 seconds
99.9% Alcohol	25 seconds
95% Alcohol	25 seconds
95% Alcohol	25 seconds
70% Alcohol	25 seconds
70% Alcohol	25 seconds
Running H_2O Wash	30 seconds
Harris Hematoxylin	4-5 minute
Running H_2O Wash	1 minute
Eosin Y Alcohol	1 minute
70% Alcohol	25 seconds
70% Alcohol	25 seconds
95% Alcohol	25 seconds
95% Alcohol	25 seconds
100% Alcohol	25 seconds
100% Alcohol	25 seconds
Xylene	25 seconds
Xylene	25 seconds
Xylene	25 seconds
Mounting Medium 용액 또는 적절한 봉입제를 사용하여 봉입을 합니다.	

참고 : 이러한 각각의 시약은 다름 염색 순서 및 다른 제조업체의 시약과 함께 사용할 수 있습니다.

GD CHEM
It's differrent when we make it
군포시 공단로 140번길 35 한웅빌딩 7층 강동그룹 701-705호
TEL.: 1588-4701
fax.: 031-429-4995
email : gd@gd-group.co.kr
http://gd-group.co.kr/main/main.php